

症例検討会

症例 2

熊本赤十字病院 龍 正樹

症例2 60歳代 女性

- 主訴：低栄養、食思不振（経口摂取困難）
- 現症：吸収不良症候群、甲状腺機能低下症、ビタミンD欠乏症、頰椎症。
貧血、白血球減少の精査目的のため、当院へ紹介受診。
- 投薬：ロペミンカプセル、ミヤBM錠、ラコールNF、チラージン、
カルシトリオール、リマプロスト α デクス錠、
リリカ、プロマック、フォリアミン、メチコバール

症例2 検査所見

血液学的検査

WBC 1.2 × 10⁹/L

RBC 1.59 × 10¹²/L

Hb 5.6 g/dL

Hct 17.3 %

MCV 108.8 fL

MCH 35.2 pg

MCHC 32.4 g/dL

PLT 152 × 10⁹/L

Ret 1.29 %

生化学検査

TP 3.0 g/dL Ca 6.0 mg/dL

ALB 1.1 g/dL 補正Ca 8.9 mg/dL

LD 228 U/L IP 3.8 mg/dL

AST 17 U/L Fe 126 µg/dL

ALT 22 U/L UIBC 28 µg/dL

ALP 197 U/L HDL-C 25 mg/dL

T-Bil 0.2 mg/dL LDL-C 57 mg/dL

BUN 43.4 mg/dL TG 68 mg/dL

Cre 1.13 mg/dL S-GLU 86 mg/dL

その他

プレアルブミン 12.3 mg/dL

フェリチン 300 ng/mL


VB₁₂ 1080 pg/mL

葉酸 ≥22.0 ng/mL

アンモニア 21 µg/dL

マグネシウム 1.0 mg/dL

末梢血液像



白血球百分比

Stab 9.5 %

Seg 67.0 %

Lymph 14.0 %

Mono 5.5 %

Eosino 3.0 %

Baso 1.0 %

NRBC 13 (/200WBC)



赤血球大小不同 (+)

破碎赤血球 (1+)


涙滴赤血球 (1+)

橢円赤血球 (1+)

PB × 200



骨髓像



BM × 100

