第69回熊本血液形態研究会

症例検討会 問題

国立病院機構熊本医療センター 米田 祐也

症例

患者 50代 男性

・ 主訴 息切れ

• 既往歴 糖尿病 脂質異常症

・現病歴 健診で貧血を指摘され、二次精査目的で紹介。一度外注検査を 含め採血のみで経過観察とした。2ヶ月後、息切れの症状が出始め 外来フォロー含め外注結果確認のため受診

来院時所見

CBC				
WBC	5.41	×10 ⁹ /L		
RBC	1.12	×10 ¹² /L		
Hb	4.1	g/dL		
Hct	11.9	%		
MCV	106.3	fL		
MCH	36.6	pg		
MCHC	34.5	g/dL		
Plt	369	×10 ⁹ /L		
Ret	0.5	%		


生化学			
TP	6.9	g/dL	
Alb	4.3	g/dL	
BUN	30	mg/mL	
Cre	1.12	mg/mL	
UA	N.A	mg/mL	
T-Bil	0.3	mg/mL	
AST	16	U/L	
ALT	15	U/L	
LD(IFCC)	264	U/L	
CK	N.A	U/L	
Na	139	mEq/L	
K	5.0	mEq/L	
CI	105	mEq/L	
CRP	<0.02	mg/dL	


凝固				
PT(s)	10.3	S		
PT(%)	121.2	%		
PT(INR)	0.91			
APTT	26.0	S		
Fbg	N.A	mg/dL		
FDP	N.A	μg/dL		


末梢血液像①


白血球分類(機械)			
WBC	5.41	×10 ⁹ /L	
Neu	27.6	%	
Lymph	63.8	%	
Mono	4.6	%	
Eosin	3.6	%	
Baso	0.4	%	

末梢血液像②









骨髄像2

